

# Opciones de Tratamiento Oral para la COVID-19

OBTENGA INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES QUE PUEDE TOMAR EN SU HOGAR PARA TRATAR LA COVID-19 DE LEVE A MODERADA.



**Paxlovid™** y **Lagevrio™** son medicamentos antivirales orales. Están aprobados y tienen autorización de uso de emergencia otorgada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. para tratar la COVID-19. Además, se ha comprobado su **seguridad y eficacia**.

Estos tratamientos antivirales orales **no reemplazan las vacunas ni las vacunas de refuerzo**. Ayudan a disminuir el riesgo de hospitalización o, peor aún, de muerte a causa de la COVID-19.

Si tiene síntomas de COVID y dio positivo para COVID-19, pueden recetarse estos medicamentos ambulatorios contra la COVID para ayudar a combatir síntomas de leves a moderados. Debe comenzar a tomar los medicamentos lo antes posible luego de que haya dado positivo para COVID. Además, debe tomarlos dentro de los cinco días de la aparición de los síntomas.

## Paxlovid

El Panel de Pautas de Tratamiento de la COVID-19 recomienda Paxlovid como el tratamiento preferido para personas que hayan dado positivo mediante la prueba viral de SARS-CoV-2. También se recomienda para personas con riesgo alto de desarrollar COVID-19 grave (lo que incluye hospitalización o muerte).

## Lagevrio

El Panel de Pautas de Tratamiento sugiere usar Lagevrio **solo cuando no está disponible Paxlovid** o cuando no se puede usar Paxlovid.

**Asegúrese de hablar con su proveedor si tiene síntomas o si dio positivo para COVID. Los médicos de Babylon y de atención de urgencia pueden recetarle tratamientos orales para la COVID.**

Para obtener más información sobre Paxlovid y Lagevrio, consulte el cuadro de la página 2.

(continúa)



## Encuentre farmacias de manera sencilla

Estas píldoras antivirales orales para la COVID-19 están disponibles solo con receta médica. Encuentre una farmacia donde pueda surtir las:

1 Use este código QR:










O visite este [sitio web](#) sobre tratamientos de la COVID-19.

2 Haga clic en el *cuadro de búsqueda* y escriba una dirección o un código postal.

3 Luego presione “Enter” (Entrar) para ver una lista de farmacias cercanas.

## Píldoras antivirales para la COVID-19: Breve descripción

	Paxlovid (Pfizer) (Nirmatrelvir/ritonavir)	Lagevrio (Merck) (Molnupiravir)
¿Para qué debe tomarlas?	Úselas para tratar síntomas de la COVID-19 de leves a moderados.	
¿Cómo se toman?	 Tome <b>tres píldoras</b> por vía oral dos veces por día, a la mañana y a la noche (seis píldoras en total por día). Tómelas junto con la comida o solas. Debe tragarlas enteras.	 Tome <b>cuatro píldoras</b> por vía oral dos veces por día, a la mañana y a la noche (ocho píldoras en total por día). Tómelas junto con la comida o solas. Debe tragarlas enteras.
¿Quiénes pueden tomarlas?	 Personas a partir de los 12 años que pesen 88 libras o más y que tengan riesgo alto.	 Personas a partir de los 18 años con riesgo alto <sup>1</sup> . <b>No están aprobadas para el uso en pacientes menores de 18 años</b> , ya que este medicamento puede afectar el crecimiento de los huesos y cartílagos.
¿Cómo funciona?	Bloquea una proteína que el virus usa para crecer.	Se inserta en la composición genética del virus.
¿Qué tan efectiva es?	Disminuye el riesgo <b>casi un 90%</b> .	Disminuye el riesgo <b>alrededor de un 30%</b> .
¿Cómo deben tomar estos medicamentos los pacientes?	 Solo con receta médica.	
¿Cuándo debe recetarse?	 Comenzar dentro de los cinco días posteriores a la primera aparición de los síntomas.	
¿Durante cuánto tiempo deben tomarse las píldoras?	 Cinco días.	

<sup>1</sup> Deben usarse únicamente cuando no hay otro tratamiento disponible para la COVID-19 de leve a moderada.



Si tiene preguntas, comuníquese con California Health & Wellness al número gratuito 877-658-0305 (TTY: 711) de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.